

## سلسلة الدراسات التصنيفية على النباتات البرية في المملكة العربية السعودية

١- دراسة كيموتصنيفية مقارنة لنبات السنامكي النامي بريًّا  
في مكة المكرمة

(١- ج) دراسة إنبات بذور نبات السنامكي وتركيب الترب  
المختلفة النامي فيها هذا النبات في أودية وجبال مكة المكرمة

محمد محمد حسن سليمان ميلاد  
قسم الأحياء ، كلية العلوم التطبيقية ، جامعة أم القرى  
مكة المكرمة - المملكة العربية السعودية

المستخلص . استهدفت هذه الدراسة استكمال الدراسات على نبات  
السنامكي النامي في أودية مكة المكرمة وفي جبالها ، حيث درست نسبة  
الإنبات في البذور ، وكذلك بعض التحاليل الكيميائية للتربة في كل من  
البيئتين الوديانية والجبلية بغية التعرف على مكوناتها ومعرفة دورها في  
مساعدة إظهار التباين بين النباتين .

وقد أوضحت النتائج أن النباتين متقاربان إلى حد ما ولكن التباين في  
نوعية وسرعة سریان بعض المركبات الفينولية يؤيد فكرة أنهما نوعان  
مختلفان ، أحدهما يعيش في البيئة الجبلية والآخر ينمو في البيئة الوديانية  
بمكة المكرمة .

## المقدمة

الستامكي *Cassia senna* نبات بري ينمو في جبال وأودية منطقة الحجاز الجنوبي من المملكة العربية السعودية<sup>[١]</sup>. وتنعم أودية وجبال مكة المكرمة بهذه النبتة التي قال فيها المصطفى صلی الله علیه وسلم: «لو كان شيء يُشفي من الموت لكان السنّا»<sup>[٢]</sup>. فتارة نجدتها في الأودية حيث التربة الرملية ، وأخرى نجدها تكسو الجبال مثبّة جذورها في الترب الموجودة في شقوق الصخور . كما تنمو في بعض المناطق الاستوائية والصحاري<sup>[٣]</sup> . ويضم هذا الجنس أنواعاً كثيرة إلا أن الإجماع عند الأقدمين يؤكّد أن أفضل هذه الأنواع هو السنّا المكي<sup>[٤، ٥]</sup> . ومن الأسماء العربية التي تطلق على نبات السنّامكي ، العشق ، السنة ، سنى ، السنى الحرمي .

وفي عام ١٨٧١ م أشار *Bentham*<sup>[٦]</sup> وأيدته دراسات *Brenam*<sup>[٧]</sup> إلى إمكانية تقسيم جنس السنّامكي إلى فئات تقسيمية أقل ؛ بناءً على التباين في المركبات الفينولية وأيدت هذا دراسة المركبات الفينولية في أجناس السنّامكي التي قام بها *Shrestha*<sup>[٨]</sup> .

في حين تابعت *Kadria*<sup>[٩]</sup> دراستها التصنيفية لبعض أنواع هذا الجنس المتزرعة في مصر الأمر الذي يشير إلى حاجة هذا الجنس للدراسات المستفيضة .

وفي هذه الدراسة سوف نتابع هذه المقارنة على المركبات الفينولية الموجودة في بتلات أزهار نبات السنّامكي *Cassia senna* النامي برياً في البيئة الوديانية وكذلك في البيئة الجبلية لمكة المكرمة .

## المواد والأجهزة والطرق

### أولاً: المواد والأجهزة

#### ١ - المواد الكيميائية المستخدمة

جميع المواد الكيميائية المستخدمة كانت على درجة عالية من النقاوة وحصل عليها من الشركة البريطانية للمواد الكيميائية *B.D.H.* بإنجلترا .

## ٢- صبغة الفينولات

تتركب هذه الصبغة من جزأين:

١ - ١٪ حديدي سيانيد البوتاسيوم في ماء مقطر .

٢ - ١٪ كلوريد حديديك في ماء مقطر .

عند الصبغ يزج ٢+١ بنسبة ١:١ وهي تعطي مع الفينولات بقعاً زرقاء اللون .

## ٣- المذيبات [١٠]

الرقم	المكونات
١	ماء مقطر
٢	خلات الايثايل - بيريدين - ماء مقطر (١٠:٤:٣) درجة الحموضة = ٥,٧ .
٣	فوريسطال ويتكون من : حمض خليك - حمض هيدروكلوريك مرکز - ماء مقطر (٣٠:٣:١٠) .
٤	فينول - ماء (٣:١) .
٥	بيوتانول متعادل - حمض خليك - ماء مقطر (٤:٥:١) . (الطبقة العليا)
٦	٪ حمض خليك ثلجي في ماء مقطر .
٧	خلات الايثايل - حمض خليك ثلجي - ماء مقطر (٣:٣:١) .

## ٤- الأجهزة

جهاز إصدار أشعة فوق البنفسجية (جلمان) .

## ثانيًا: الطرق

### أ- تحضير العينات

#### ١) تحضير العينات للفصل الكروماتوجرافي

وهذه المرحلة اعتمدت أساساً على فصل المركبات الفينولية الموجودة في البتلات (جميع البتلات - البتلة الخلفية - جميع البتلات عدا البتلات الخلفية) الطازجة حيث أخذت ١٠ جرامات من البتلات ووضعت في ١٠٠ مل من الإيثانول ٩٥٪ ثم سخنت

في حمام مائي لمدة خمس دقائق للتشويت وهرست جيداً وأعيد تسخينها في الحمام المائي للاستخلاص ثم تركت العينة حتى بردت وأضيف إليها بعض قطرات من حمض الهيدروكلوريك المركز لتشويت المركبات الفينولية في صورة أملاح [١١].

## ٢) التميؤ


في زجاجة ساعة أخذت ١٠ مل من مستخلص البتلات (جميع البتلات - البتلة الخلفية - جميع البتلات عدا البتلة الخلفية) وجففت من الكحول ثم أخذت في ١٠ مل من حمض الهيدروكلوريك المخفف ووضعت في أنبوبة التميؤ وقفلت وسخنت عند ١٠٥ ملدة ٦ ساعات ثم نقلت إلى أنبوبة أخرى وأضيف إليها ١٠ مل من خلات الإيثايل ورجت جيداً لمدة ١٥ دقيقة حيث ذابت الفينولات في خلات الإيثايل وصارت على هيئة طبقة علوية، أخذت وأجري لها الفصل الكروماتوجرافي [١١].

## ب- التحاليل


تم فصل الفينولات المستخلصة من البتلات باستخدام الفصل الكروماتوجرافي الورقي (1) في اتجاه واحد ثم اتجاهين قبل وبعد التميؤ وفي مذيبات مختلفة وقد كشف عنها في الضوء العادي وتحت الأشعة فوق البنفسجية ثم بتعریضها لأبخرة الأمونيا وأيضاً باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بعد تعریضها للأمونيا وأخيراً الصبغ بصبغة الفينولات [١١].

## المناقشة

أشارت نتائج المرحلة الأولى من هذه الدراسات (١-أ) - دراسة المركبات الفينولية في أوراق نبات السنامكي النامي بريأً في مكة المكرمة) إلى إمكانية تصنيف نبات السنامكي النامي في الجبل والوادي على أنهما نوعان مختلفان أحدهما ينمو في البيئة الجبلية والآخر ينمو في البيئة الوديانية. ويؤيد ذلك نتائج هذه المرحلة حيث يوضح الشكل رقم (١-أ ، ١-ب) وكذلك الجدول رقم (١) نتائج الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية المرتبطة بالكريبوهيدرات المستخلصة من بلالات أزهار نبات السنامكي النامي في البيئة الجبلية رقم (١) وكذلك في البيئة الوديانية



شكل رقم (١-أ). الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية في بذلات نبات السنامكي النامي في البيئة الجبلية في مكة المكرمة .



شكل رقم (١-ب). الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية في بذلات نبات السنامكي النامي في البيئة الوديانية في مكة المكرمة .

جدول رقم (١). نتائج الفصل الكروماتوغرافي الورقي في اتجاهين للمركيبات الفينولية المرتبطة بالكربوهيدرات في بتلات نبات السنامكي.


سرعة السريان في المذيب رقم (٥) $\times 100$	سرعة السريان في المذيب رقم (٦) $\times 100$	بعد الصبغ بصبغة الفينولات	بالتعريض لأبخرة الأمونيا والفحص بالأشعة فوق البنفسجية	بالتعريض لأبخرة الأمونيا والفحص في الضوء العادي	باستخدام الأشعة فوق البنفسجية	الفحص في الضوء العادي
٩١	٣	١ زرقاء	١ سمراء	١ سمراء	١ صفراء	١ صفراء
٦٤	٣٠	٢ زرقاء	٢ سمراء	٢ سمراء	٢ صفراء	٢ صفراء
٩٣	٣	١ زرقاء	١ سمراء	١ سمراء	١ صفراء	١ صفراء
٦٢	٣١	٢ زرقاء	٢ سمراء	٢ سمراء	٢ صفراء	٢ صفراء
٨٥	٢٩	٣ زرقاء	٣ سمراء	٣ سمراء	-	-
٦٨	٦٣	٤ زرقاء	-	-	-	-

رقم (٢). ويتبين من هذه النتائج أن الفحص في الضوء العادي أظهر وجود مركيبين فقط في كلا النباتين متماثلين في لونهما ومتقاربين في سرعة السريان في المذيب رقم (٥) والمذيب رقم (٦) إلا أن التعريض للأبخرة الأمونيا أظهر بقعة ثالثة في مستخلص بتلات النبات النامي في الوادي رقم (٢) وأكد ذلك الفحص بالأشعة فوق البنفسجية بعد التعريض للأمونيا في حين أظهر الصبغ بصبغة الفينولات بقعة رابعة زرقاء في مستخلص بتلات أزهار النبات النامي في الوادي وبذا يظهر لنا اتساع الفرق بين كلا النباتين حيث نجد أن مستخلص بتلات النبات النامي في البيئة الجبلية يحتوي على مركيبين فينوليدين فقط أما مستخلص بتلات النبات النامي في البيئة الوديانية فيحتوي على أربعة مركيبات فينولية.


وقد أكدت نتائج الفصل الكروماتوغرافي الورقي في اتجاهين للفينولات المرتبطة بالكربوهيدرات المستخلصة من البتلة الخلفية فقط والموضحة في الجدول رقم (٢) والشكلين (٢-٢، ٢-أ، ب) هذه الفروقات حيث نجد تطابق هذين النباتين في المركب رقم (١) وهو المركب الوحيد الذي فصل من مستخلص البتلة الخلفية لنبات السنامكي

جدول رقم (٢). نتائج الفصل الكروماتوجرافي في اتجاهين للمركبات الفينولية المرتبطة بالكريبوهيدرات في البلة الخلفية فقط لنبات السنامكي .

الفحص في الضوء العادي	باستخدام الأشعة فوق البنفسجية	بالعرض لأبخرة الأمونيا	بالعرض والفحص في الضوء العادي	بالعرض لأبخرة الأمونيا والفحص بالأشعة فوق البنفسجية	بعد الصبغ بصبغة الفنولات	سرعة السريان في المذيب رقم (٥)	سرعة السريان في المذيب رقم (٦)
١ ـ ـ ـ ـ	١ شديدة الصفار	١ شديدة الصفار	١ صفراء مسمرة	١ سمراء	١ زرقاء	٩١	٣
ـ ـ ـ ـ ـ	١ شديدة الصفار	١ شديدة الصفار	١ صفراء مسمرة	١ سمراء	١ زرقاء	٩١	٤
ـ ـ ـ ـ ـ	٢ صفراء	-	٢ سمراء	٢ سمراء	٢ زرقاء	٦٥	٣٣



شكل رقم (٢-أ). الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية في البلة الخلفية لأزهار نبات السنامكي النامي في البيئة الجبلية في مكة المكرمة .



شكل رقم (٢-ب). الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية في البتلة الخلفية لأزهار نبات السنامكي النامي في البيئة الوديانية في مكة المكرمة .


النامي في البيئة الجبلية في حين نجد أن مستخلص البتلة الخلفية لنبات السنامكي النامي في البيئة الوديانية تحتوى على مركب آخر ظهر باللون الأصفر في الضوء العادي ولم يظهر بالكشف بالأشعة فوق البنفسجية . في حين ظهر كبقعة سمراء في الجو المشبع بأبخرة الأمونيا وكذلك باستخدام الأشعة فوق البنفسجية بعد التعريض لأبخرة الأمونيا وباللون الأزرق عند الصبغ بصبغة الفينولات وكانت سرعة سريانه في المذيب رقم (٥) = ٦٥ أما في المذيب رقم (٦) فكانت = ٣٣ .

كما توضح أيضاً نتائج الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للفينولات المرتبطة بالكريوهيدرات والمستخلصة من بتلات الأزهار عدا البتلة الخلفية هذا التباين بصورة أوضح كما في جدول رقم (٣) والشكليين (٣-أ، ٣-ب) .


ولعل السبب في استخدام البتلة الخلفية على حدة ثم البتلات عدا البتلة الخلفية راجع إلى عدم وضوح الوصف في المراجع المتخصصة في التركيب التشريحي للتتويج

جدول رقم (٣). نتائج الفصل الكروماتوجرافي في اتجاهين للمركبات الفينولية المرتبطة بالكربوهيدرات في بتلات أزهار نبات السنامكي عدا البتلة الخلفية.

الفحص في الضوء العادي	باستخدام الأشعة فوق البنفسجية	بالعرض لأبخرة الأمونيا	بالعرض والفحص في الضوء العادي	بالعرض والفحص بالأشعة فوق البنفسجية	بعد الصبغ بصبغة الفنولات	سرعة السريان في المذيب رقم (٥) $100 \times$	سرعة السريان في المذيب رقم (٦) $100 \times$
١ أصفر بني مصفر	١ أصفر ٢ بني مصفر	١ شديد الصفرة ٢ بني داكن	١ بني مضيء ٢ بني داكن	١ أسمر ٢ بني مضيء	١ أزرق ٢ أزرق	٩٠ ١٩	٢ ٩١
١ أصفر ٢ أصفر ٣ أصفر ٤ بني مصفر	١ أصفر ٢ أصفر ٣ أصفر ٤ بني مصفر	١ شديد الصفرة ٢ شديد الصفرة ٣ أصفر ٤ بني مضيء	١ شديد الصفرة ٢ شديد الصفرة ٣ أصفر ٤ بني مضيء	١ أسمر ٢ أسمر ٣ أسمر ٤ بني مضيء	١ أزرق ٢ أزرق ٣ أزرق ٤ أزرق	٩٢ ٦٦ ٨٢ ١٧	٤ ٣٤ ٣٤ ٩٤



شكل رقم (٣-أ). الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية المرتبطة بالكربوهيدرات في بتلات نبات السنامكي (عدا البتلة الخلفية) النامي في البيئة الجبلية في مكة المكرمة.



شكل رقم (٣-ب). الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاهين للمركبات الفينولية المرتبطة بالكربوهيدرات في بتلات نبات السنامكي (عدا البتلة الخلفية) النامي في البيئة الوديانية في مكة المكرمة .

في تحت الفصيلة البقمية Subfamily : Caesalpinoideae [١٢]. في حين يصفها Batanouny [١٣] بأنها بتلات صفراء عادة كبيرة ، أما البتلة الخلفية فصغريرة الحجم . أما Migahid [١٤] فوصف بتلات جنس السنا بأنها غير منتظمة في تراكبها كنباتات تحت الفصيلة البقمية ، ولا تحت الفصيلة الفراشية ؛ إذ تحتوي على بتلة خلفية تتوجه إلى الداخل ، في حين وصف البتلة الخلفية والتي تميز تحت الفصيلة البقمية عن غيرها بأنها داخلية ولم يحدد وضعها عند وصفه لتوسيع نبات السنامكي *Cassia senna.*(L) واكتفى بقوله : إن التوسيع يتكون من خمس بتلات - متراكبة - صفراء ، والبتلة الخلفية أصغر من بقية البتلات [١١] .

أما بعد التميؤ واستخدام الفصل الكروماتوجرافي الورقي في اتجاه واحد والفصل بالمذيبات (١، ٢، ٣، ٤، ٥) وكذلك عند الفصل في اتجاهين بالمذيبين (٥، ٢) لم نجد أي فروق في الفينولات أي إن التباين مقتصر فقط على الفينولات المرتبطة بالكربوهيدرات أي قبل التميؤ .

## الراجـعـ

- Migahid, A.M.** (1978). "Flora of Saudi Arabia" pp.940. 2nd ed. 2 voIs. Riyadh University, (١) Riyadh,Saudi Arabia.
- (٢) ابن قيم الجوزية ، شمس الدين (١٩٥٧ م - ١٣٧٧ هـ) . «الطب النبوي» ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- (٣) فوزي ، حسين (١٩٧٩ م - ١٣٩٩ هـ) . «النباتات الطيبة : زراعتها ومكوناتها» ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس .
- (٤) الأنطاكي ، داود (١٨٨٢ م - ١٣٠٢ هـ) . «تذكرة الحكيم داود الأنطاكي» ، الطبعة الأولى ، مطبعة العامر ، الشرقية ، مصر .
- (٥) ابن البيطار ، ضياء الدين (١٩٧٥ م - ١٣٩٥ هـ) . «الجامع لفروقات الأدوية والأغذية» ، المجلد الثالث ، مكتبة المثنى ، بغداد .
- Bentham, G.** (1871) XVIII. "Revision of the Genus Cassia". pp. 503-591. (٦)
- Brenan, J.P.M.** (1958). New and Noteworthy Cassias from Tropical Africa. pp. 231-252. (٧) Kew Bulletin.
- Shrestha, A.B.** (1966). The Biological Significance of Anthraquinones in Certain Cassia (٨) Species. School of Pharmacy, University of London, London, U.K.
- Kadria, A.A.** (1988) Taxonomic Studies on some species of *Cassia* L. Cultivated in Egypt. (٩) Bull. Fac. of Agric., Univ. of Cairo, 39(1) : 93-118.
- Harborne, J.B. Mabry, T.J. and Mabry, H.** (1975). *The Flavonoids*. Academic Press, (١٠) New York, San Francisco.
- Meelad, M.** (1987). Some Floristic and Chemotaxonomic Studies of The Flowering Plants (١١) of Makkah. Ph.D. Thesis, Department of Biological Sciences, University of Salford. Salford, Lancs, U.K.
- (١٢) سعد ، شكري إبراهيم (١٩٧٩ م) . «النباتات الزهرية ، نشأتها - تطورها - تصنيفها» . الهيئة المصرية العامة للكتاب ، فرع الإسكندرية ، الطبعة الرابعة .
- Batanouny, K.H.** (1981). *Ecology and Flora of Qatar*. 1st ed. 245p. Alden Press, Oxford. (١٣)

A Chemotaxonomic Series of Flora of Saudi Arabia  
1- Comparative Chemotaxonomic Study on *Cassia senna* (L.)  
(1-b) Study of the Phenolic Components of *Cassia senna* (L.)  
Which Grows in the Valleys and Mountains of  
Makkah al-Mukarramah

M. M. MEELAD

*Biology Department, Faculty of Applied Science,  
Umm Alqura University, Makkah al-Mukarramah*

**ABSTRACT.** The phenolic components of the fresh petals of the two morphological similar *Cassia senna* (L.) plants were extracted and then examined using the technique of paper chromatography.

The results of phenolic components separation show that the number and position of separated and detected components differ. It may be concluded that the two Cassia's under investigation are two species; one grows in valleys and the other grows between the rocks of Makkah mountains.